



Cabinet d'Orthodontie et d'Orthopédie Dento-faciale
Dr RAGONIT-LEPELTIER Delphine
Dr LEPELTIER Rémy

Docteurs en Chirurgie-Dentaire
Certificat d'études cliniques spéciales
Mention orthodontie
Spécialistes qualifiés en Orthopédie Dento-Faciale

Conseils utiles pour appréhender certains petits problèmes en vacances...

Pour les bagues



Fil irritant les joues ou les lèvres

Si un fil irrite la lèvre ou la joue, un coupe-ongles peut être très utile pour couper le fil.

Une pince à épiler peut être utile pour repositionner le fil dans la bague. Sinon, le recouvrir avec de la cire et contacter le cabinet par mail pour prendre rendez-vous.

Pour appliquer la cire, il suffit d'en prendre un morceau entre le pouce et l'index pour en former une petite boule (taille petit pois).

La cire est ensuite positionnée sur le boîtier (bague) ou piquée dans le bout de fil qui blesse.

Perte de ligatures élastomères ou métalliques

Les ligatures élastomères (transparentes ou grises) : elles fixent le fil au boîtier mais parfois sous l'effet de la nourriture ou du brossage, elles peuvent s'enlever sans gravité.

Les ligatures métalliques piquent : il suffit de repousser le bout de la ligature à l'origine de l'irritation avec la pince à épiler ou avec le doigt (attention de ne pas vous piquer), de façon à le plaquer le long du boîtier ou de mettre de la cire.

Perte de boîtiers (bagues, attaches)

Si le boîtier ne blesse pas, il n'y a pas d'urgence et tout sera résolu au prochain rendez-vous, ou alors dans cette attente, si le boîtier est en rotation sur le fil, gêne et irrite la lèvre, il est alors possible de mettre de la cire pour adoucir le relief du boîtier.

Si le boîtier est décollé (sur lequel vous devez attacher les élastiques), vous pouvez aller le faire recoller auprès d'un orthodontiste sinon **NE PLUS PORTER LES ELASTIQUES DES 2 COTES.**

Si vous n'avez plus de cire elle s'achète à la pharmacie ou bien mettre de la cire de BABYBEL.

Pour les appareils amovibles

En cas de blessure au niveau de la résine, limer avec une petite lime cartonnée doucement. L'appareil doit toujours être porté car sinon au bout de 2 jours il n'ira plus.



Cabinet d'Orthodontie et d'Orthopédie Dento-faciale
Dr RAGONIT-LEPELTIER Delphine
Dr LEPELTIER Rémy

Docteurs en Chirurgie-Dentaire
Certificat d'études cliniques spéciales
Mention orthodontie
Spécialistes qualifiés en Orthopédie Dento-Faciale

Pour les aligneurs



Si un aligneur est cassé et que le changement d'aligneur est proche vous pouvez procéder au changement plus tôt que prévu. Le nouvel aligneur risque de forcer, il faut persister.

Si lors du changement d'aligneur il ne rentre pas revenez au précédent.

Si un taquet s'est décollé, continuez le port des aligneurs

Si un bouton permettant le port des élastiques s'est décollé **NE PLUS PORTER LES ELASTIQUES DES 2 COTES.**

Dans tous les cas prévenir le cabinet par mail.

Pour les barres métalliques CARRIERE



Si la barre Carriere est décollée au niveau de la partie antérieure (canine), prenez la barre entre le pouce et l'index et faites un mouvement à l'horizontal et en arrière vers la joue (commisure des lèvres), jusqu'à que celle-ci se déboite de l'attache de la molaire.

Si une gouttière se casse, continuer avec la deuxième gouttière et prévenir le cabinet par mail.



NE PLUS PORTER LES ELASTIQUES DES 2 COTES.

Dans tous les cas, prévenir le cabinet par mail.

Services de garde (en dernier recours...)

Un service de garde est organisé les dimanches et jours fériés par le Conseil de l'Ordre Département des Chirurgiens –Dentistes (tel au 15 (SAMU) : ils vous diront où se trouve le dentiste de garde)

Le cabinet d'orthodontie vous souhaite de passer d'excellentes vacances



Cabinet d'Orthodontie et d'Orthopédie Dento-faciale
Dr RAGONIT-LEPELTIER Delphine
Dr LEPELTIER Rémy

Conseils utiles pour appréhender certains petits problèmes en vacances

Pour les Quad-Helix et Disjoncteur (appareil au palais)



En cas de problème, contacter un professionnel de santé (orthodontiste, dentiste ou en dernier recours les urgences hospitalières).

Si une bague est descellée

L'appareil est peut-être repositionnable : Le professionnel de santé peut replacer la bague avec les doigts autour de la dent et la coller avec du composite fluide.

En attendant, vous pouvez vous-même tenter de repositionner la bague sur la dent.

Si l'appareil n'est pas repositionnable :

-Si le professionnel de santé possède une pince à débaguer, il peut desceller la bague toujours en place pour déposer entièrement l'appareil. Nous le remettons en place lors d'un prochain rendez-vous.

-Dans le cas où le professionnel de santé ne possède pas de pince à débaguer : il peut couper l'appareil au niveau du bras métallique soudé à la bague toujours en place sur la dent. Laisser la bague toujours scellée en place.

Si l'appareil est anormalement enfoncé dans le palais ou qu'il blesse la langue

Le professionnel de santé peut tirer avec une pince à mors fins (weingart, davier racine, ...) sur le bras ou sur l'anse antérieure. Si besoin couper le bras.

En cas de blessure sur la langue, en attendant une consultation avec un professionnel de santé, vous pouvez mettre un morceau de cire directement sur la partie irritante de l'appareil.

